DLP-8-4-87057819

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES SEMENCES N° 1 - 9 mars 1987

SPECIAL COLZA


(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault et les Sociétés Coopératives Agricoles SUD-CEREALES et de BARJAC)

CHARANÇON DE LA TIGE
- TOUT DÉBUT DES CAPTURES
- RENFORCER LA SURVEILLANCE

LARVES DE GROSSE ALTISE :
- DERNIÈRE LIMITE POUR UNE SOLUTION DE RATTRAPAGE

CHARANCON DE LA TIGE :

Avec le redoux et l'ensoleillement de cette dernière période, les premiers charançons de la tige ont été piégés dans les secteurs de Uzès, Brouzet les Alès, Saint Jean de Maruejols, Barjac et les colzas les plus avancés atteignent le stade sensible C1.



largeur 3-4 mm

S U R V E I L L E Z vos cultures et réalisez un traitement dès que :

- les captures sont supérieures à 10 par jour (ou 40 à 50 pendant une période de 4 à 5 jours)

- ou que vous observez une piqûre (= 1 ponte) par tige en moyenne sur 50 plants entre les stades C1 et tige 20 cm

Spécialités à utiliser : voir la fiche jointe.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

13

LARVES DE GROSSE ALTISE

A l'automne dernier certaines parcelles ont été parfois assez fortement attaquées et pas toujours protégées.

Les larves minent les pétioles des feuilles et peuvent passer dans le coeur et détruire le bourgeon terminal.

Observez et traitez au besoin au seuil de 2 plantes sur 3 attaquées à l'aide d'un produit à forte action de choc (parathion huileux à 300-350 g de m.a./ha) et par beau temps (températures supérieures à 10°C).



largeur 0,5 à 1 cm